

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ


ЧИННИЙ СТАНОМ НА СІЧЕНЬ 2023 РОКУ

Вакцинація проти	Новонароджений	6 тижнів	2 місяці	4 місяці	6 місяців	9 місяців	12 місяців	18 місяців	2 роки	5 років	6 років	9-14 років	16 років	Дорослі 18+ років	
Гепатиту В	1 доза		2 доза		3 доза	Раніше не вакцинованим: ввести три дози (1-2 доза – інт. 1 місяць, 2-3 доза – інт. 5 місяців)							Ввести три дози (1-2 доза – інт. 1 місяць, 2-3 доза – інт. 5 місяців)		
Туберкульозу (БЦЖ)		Раніше не вакцинованим: віком понад 2 міс. при негативному результаті РМ													
Кашлюка, дифтерії, правця (КДП) Дифтерії, правця (ДП)			1 доза КДП	2 доза КДП	3 доза КДП			4 доза КДП			ДП		ДП	ДП кожні 10 років	
Поліомієліту			1 доза ІПВ	2 доза ІПВ	3 доза ОПВ			4 доза ОПВ			ОПВ	14 р ОПВ		За епідоказами	
НіВ-інфекції			1 доза	2 доза			3 доза	Щеплення проводиться до 4 р. 11 міс. 29 днів		За станом здоров'я. Раніше не вакцинованим: ≥ 5 років - 1 доза					
Кору, епідемічного, паротиту, краснухи					При несприятливій епідситуації 1 доза (до 12 міс не зараховується)		1 доза				2 доза				
Пневмококової інфекції			1 доза	2 доза			3 доза			10-валентна кон'югована 13-валентна кон'югована одноразово 0,5 мл					
Ротавірусної інфекції			1 доза	2 доза		Моновалентна: Вакцинація має бути проведена до 24 тижнів життя									
			1 доза	2 доза	3 доза	Пентавалентна: Вакцинація має бути проведена до 32 тижнів життя									
Менінгококової інфекції	А, С, У та W-135 кон'югована правцевим анатоксином		1 доза	2 доза			3 доза								
	А, С, У та W-135 кон'югована дифтерійним анатоксином					9-23 міс.: 2 дози з інтервалом 3 міс.			15 - 55 р., якщо після попередньої дози мін. 4 роки - одноразово						
	Серогрупа В		2-5 міс: 3 дози з інт. > 1 міс., або 2 дози з інт. > 2 міс. та ревакц. в 12-15 міс		6-11 міс: 2 дози з інт. > 2 міс. та ревакц. на 2 році, але інт. > 2 міс		12 міс - 2 р: 2 дози з інт. > 2 міс. та ревакц. > 12-23 міс.		2р. + та дорослі: 2 дози з інт. > 1 міс. Ревакц. лише при збереженні ризику						
Вітряної віспи					1 доза	Ввести 2-гу дозу через 6 т. після 1-ої дози (але не раніше 4 т. від введення 1 дози)									
Гепатиту А						1 доза	Ввести 2-гу дозу через 6 міс								
Папіломавірусної інфекції							Бівалентна (серотипи: 16, 18)		2 дози (інт. 6 м.)		≥ 15 р. - 3 дози: 0-1-6 міс.				
							Квадривалентна (серотипи: 16, 18, 6, 11)				≥ 14 р. - 3 дози: 0-2-6 міс.				
Жовтої лихоманки					6 - 9 міс. не рекомендована, за винятком особливих обставин		1 доза (В003: ревакцинація не проводиться)								
Кліщового енцефаліту							3 дози. Перша ревакцинація через 3 роки, наступні - кожні 5 років від першої ревакцинації								
Черевного тифу							1 доза. Ревакцинація кожні 3 р, якщо є ризик захворювання								
Грипу						Вперше в житті (лише для дітей ≥ 9 років): 2 дози з інт. в 28 днів, надалі - 1 доза щороку						1 доза щороку			

- Вакцинація в рамках календаря щеплень. Вакцини забезпечуються в рамках Національної програми імунопрофілактики (НПІ)
- Рекомендовані щеплення, що не забезпечуються НПІ. Приведені варіанти вакцинації

- Можливість проведення вакцинації, якщо щеплення проводяться поза календарем / рекомендований вік. (схему вакцинації уточніть у свого лікаря)
- Проведення вакцинації в окремих ситуаціях

- Вакцинація не проводиться
- < менше / до вказаного віку;
- > понад вказаного віку включно;
- КДП = АКДП / АаКДА;
- ДП = АДП / АДП-М



vaccine.org.ua